

**CORPORACIÓN MUNICIPAL VIÑA DEL MAR PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
AREA DE SALUD**



**CARTA MADRES, PADRES Y/O APODERADOS
VACUNACIÓN ESCOLAR EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19**

Viña del Mar, 2020

ESTIMADOS/AS
MADRES, PADRES Y/O APODERADOS.

Por medio del siguiente documento informamos a ud., Ministerio de Salud ha determinado el inicio de la **Vacunación Escolar 2020** el cual será ejecutado en Establecimientos Educativos en cursos de **1° Básico, 4° Básico, 5° Básico y 8° Básico** según establece Decreto N°865 del 15 de Septiembre 2015, con medidas de resguardo de una vacunación segura en contexto de **Emergencia Sanitaria por Pandemia COVID-19**.

La manera más efectiva de mantener a su hijo/a sano/a es a través de la vacunación, ya que previene enfermedades que pueden llegar a ser peligrosas. La vacunación tiene como objetivo la disminución de las enfermedades y la mortalidad asociada a enfermedades inmunoprevenibles en el país. Por este motivo, la vacunación es de carácter obligatorio, respaldado por decreto del Ministerio de Salud.

En contexto de **Pandemia COVID-19**, como medida sanitaria, realizaremos el proceso de vacunación en sus establecimientos educativos para mayor seguridad. Además, hemos organizado la vacunación por nivel educativo con citación de manera escalonada para evitar aglomeraciones.

Por lo anterior, será importante tomar en cuenta siguientes consideraciones:

1. La vacunación se administra a *personas sanas*.

Según Ministerio de salud "Aunque no existen contraindicaciones médicas para vacunar a una persona con COVID-19" o "personas que hayan tenido contacto con un caso COVID-19", "se recomienda deferir toda vacunación hasta su completa recuperación" y/o "haya cumplido la cuarentena (14 días después de la última exposición)".

Por este motivo, **personas con estado febril y/o otros síntomas sugerentes de infección aguda (COVID-19 u otra) o que hayan sido notificados como contacto de persona con diagnóstico COVID-19, NO DEBEN acudir al establecimiento educativo durante la jornada de vacunación** y deben consultar con médico. Esto, evita exponer al resto de la comunidad escolar.

2. Es importante que tanto los niños/as como sus acompañantes se presenten a vacunación con mascarilla.
3. Se instruye al establecimiento educativo realizar limpieza previa a la actividad.
4. Con motivo de evitar aglomeraciones, se solicita acudir a vacunación en horario indicado según curso.
5. Se solicita a los apoderados respetar las citaciones de vacunación por curso, y evitar traer alumnos de otros niveles en citación que no corresponde su vacunación ya que de esta manera prevenimos errores al momento de vacunar.
6. Solo en caso necesario, se permitirá solo 1 acompañante por niño/a.
7. Resguardar al menos 2 metros de distancia entre personas durante toda la jornada.
8. Se les solicita tanto a los apoderados responsables como al personal educativo, que, durante la jornada de vacunación, se mantenga siempre los menores a su alcance, impidiendo que niños jueguen o interactúen entre sí. Esto, con el fin de evitar posibles contagios.

**CORPORACIÓN MUNICIPAL VIÑA DEL MAR PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
AREA DE SALUD**

Nivel	Vacuna	Protege contra	Contraindicaciones y/o Precauciones	Reacciones y Cuidados
1° Básico	Tres Vírica	Sarampion, Rubéola y Paperas	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes de reacción alérgica severa o alergia a algún componente de la vacuna (gelatina, sorbitol, neomicina) • Historia de alergia u otras complicaciones con dosis o vacunas previas • Historia de reacciones anafilácticas a huevo. • Tiene un sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad (como cáncer o VIH/SIDA) o a tratamientos médicos (como radiación, inmunoterapia, corticoesteroides o quimioterapia) • Tratamiento con inmunoglobulinas o transfusiones de sangre en los últimos 3 meses. • Cuadro febril aguda. Normalmente una enfermedad leve, como un resfriado, no es motivo para posponer una vacunación, pero las personas que tienen una enfermedad moderada o grave probablemente deben esperar. 	<p>Reacciones locales esperados (sitio de punción): Enrojecimiento, edema, dolor, equimosis e induración.</p> <p>Las reacciones adversas generalmente son leves, los más comunes son: fiebre y leve sarpullido que puede aparecer hasta 14 días después de la vacunación, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones.</p>
	dTpa (acelular)	Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes de reacción alérgica severa o alergia a algún componente de la vacuna (adsorbido en hidróxido de aluminio y fosfato de aluminio) • Historia de alergia u otras complicaciones con dosis o vacunas previas • Historia de encefalopatía de etiología desconocida. • Cuadro febril aguda. Normalmente una enfermedad leve, como un resfriado, no es motivo para posponer una vacunación, pero las personas que tienen una enfermedad moderada o grave probablemente deben esperar. 	<p>Reacciones locales esperados (sitio de punción): Enrojecimiento, edema, dolor, equimosis e induración.</p> <p>Las reacciones adversas generalmente son leves, los más comunes son: Irritabilidad, somnolencia, dolor de cabeza, fiebre menor a 37.5°C, diarrea, y vomito.</p>
4° Básico	VPH (primera dosis)	Infección por Virus del Papiloma Humano	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes de reacción alérgica severa o alergia a algún componente de la vacuna (sulfato hidroxifosfato de aluminio amorfo, l-histidina, polisorbato 80, borato de sodio). • Historia de alergia u otras complicaciones con dosis o vacunas previas • Cuadro febril aguda. Normalmente una enfermedad leve, como un resfriado, no es motivo para posponer una vacunación, pero las personas que tienen una enfermedad moderada o grave probablemente deben esperar. • No se recomienda su uso durante el embarazo. 	<p>Reacciones locales esperados (sitio de punción): Enrojecimiento, edema, dolor, equimosis e induración.</p> <p>Las reacciones adversas generalmente son leves, los más comunes son: dolor de cabeza, mareo y nauseas.</p>
5° Básico	VPH (segunda dosis)	Infección por Virus del Papiloma Humano	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes de reacción alérgica severa o alergia a algún componente de la vacuna (adsorbido en hidróxido de aluminio y fosfato de aluminio) • Historia de alergia u otras complicaciones con dosis o vacunas previas • Historia de encefalopatía de etiología desconocida. • Cuadro febril aguda. Normalmente una enfermedad leve, como un resfriado, no es motivo para posponer una vacunación, pero las personas que tienen una enfermedad moderada o grave probablemente deben esperar. 	<p>Reacciones locales esperados (sitio de punción): Enrojecimiento, edema, dolor, equimosis e induración.</p> <p>Las reacciones adversas generalmente son leves, los más comunes son: dolor de cabeza, náuseas, y mareos.</p>
8° Básico	dTpa (acelular)	Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes de reacción alérgica severa o alergia a algún componente de la vacuna (adsorbido en hidróxido de aluminio y fosfato de aluminio) • Historia de alergia u otras complicaciones con dosis o vacunas previas • Historia de encefalopatía de etiología desconocida. • Cuadro febril aguda. Normalmente una enfermedad leve, como un resfriado, no es motivo para posponer una vacunación, pero las personas que tienen una enfermedad moderada o grave probablemente deben esperar. 	<p>Reacciones locales esperados (sitio de punción): Enrojecimiento, edema, dolor, equimosis e induración.</p> <p>Las reacciones adversas generalmente son leves, los más comunes son: dolor de cabeza, náuseas, y mareos.</p>

**CORPORACIÓN MUNICIPAL VIÑA DEL MAR PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
AREA DE SALUD**

Si aparece fiebre, desabrigue al niño/a, adminístrele líquido y paracetamol de acuerdo a la dosis recomendada por su pediatra. En caso de fiebre igual o mayor a 37.5°C que no cede con paracetamol, preferir consultar a través de tele-consultas o llamar a Salud Responde 600 360 7777.

- Si su hijo/a por indicación médica no debe ser vacunado por motivos de salud incompatible, deberá acreditarlo solo por medio de un **CERTIFICADO MEDICO que se debe presentar a enfermera el día de la vacunación**. Como madre/padre/apoderado, ud tiene el deber de informar sí su hijo/a presenta alguna de estas contraindicaciones y/o alguna condición que amerite precauciones especiales.
- Según lo establecido por MINSAL, en ausencia de certificado médico otra notificación por escrita, la enfermera coordinadora asumirá que no existen contraindicaciones ni otro tipo de impedimentos para administrar la vacunación.
- Todo menor ausente en la fecha de vacunación asignada para su establecimiento educacional, deberá consultar al Centro de Salud con vacunatorio más cercano a su domicilio. Consultar horarios de vacunatorio.
- Toda reacción adversa asociada a las vacunaciones que presente el menor vacunado/a deberá ser informada al Centro de Salud a cargo de la vacunación de producirse en domicilio o días posteriores; o llamar a salud responde 600 360 7777.

Para el resguardo de la comunidad educativa será importante la colaboración de todos y respetar las instrucciones entregadas por el sector salud y sus profesionales, quienes los guiarán en este proceso.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	DIRECCION	FONO
CESFAM MIRAFLORES	Avda. Eduardo Frei esq. El Membrillo s/n, Miraflores Alto	32 264 5181
CESFAM NUEVA AURORA	Variante Agua Santa P/ 5, Nueva Aurora	32 227 2214
CESFAM GÓMEZ CARREÑO	19 Poniente n°5650, 4° Sector, Gómez Carreño	32 227 2263
CESFAM DR. JORGE KAPLAN	Avenida Quinta 875 Paradero 8 ½, Reñaca Alto	32 287 3368
CESFAM LAS TORRES	Avenida la Paz esquina Pakarati, Forestal Alto	32 258 2568
CESFAM BRIGIDA ZAVALA	Avenida Blanca Vergara n°1792, Forestal Alto	32 227 2255
CESFAM JUAN CARLOS BAEZA	Avenida Tamarugal, n°350, El Olivar	32 285 2179
CESFAM LUISTANIA	Bellavista n°1228, Miraflores Alto	32 227 2342
CESFAM CIENFUEGOS	Calle 7 entre 21 y 22 Norte, Sta Inés	32 278 0008
CESFAM MARCO MALDONADO	Alvarez n°1682, Viña del Mar	32 227 2361
CECOSF STA JULIA	Avenida Campo de Flores n°46, Sta Julia	32 227 2231

ANEXO 1

¿Cuándo usar mascarilla?

PLAN DE ACCIÓN
CORONAVIRUS
COVID-19



- Si estás sano, sólo necesitas llevar mascarilla **si vas a estar a menos de un metro de distancia de alguien con COVID-19.**
- Usa mascarilla **si tienes tos o estornudos.**
- Si viajas en transporte público y **concurres a lugares donde hay más personas como supermercados, bancos u otros.**

Las mascarillas **sólo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos** con agua y jabón o con el uso de solución de alcohol.

LLAME A SALUD RESPONDE
600-360-7777

#CuidémonosEntreTodos

¿Cómo usar y quitarse una mascarilla?

PLAN DE ACCIÓN
CORONAVIRUS
COVID-19

- 

1
Antes de ponerte una mascarilla, **lávate las manos con agua y jabón** o usa una solución de alcohol.
- 

2
Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate que no haya espacios entre tu cara y la máscara.
- 

3
Evita tocar la mascarilla mientras la usas.
Si lo haces, **lávate las manos con agua y jabón** o usa una solución de alcohol.
- 

4
Quítate la mascarilla por detrás, sin tocar la parte delantera, y deséchala de inmediato en un recipiente cerrado. **Lávate las manos con agua y jabón.**

El Ministerio de Salud recomienda el uso de mascarillas **sólo si vas a estar a menos de un metro de distancia de cualquier persona.**

LLAME A SALUD RESPONDE
600-360-7777

#CuidémonosEntreTodos